

عزيزي المريض / الممثل القانوني؛
يحق لك أن تكون على علم بجميع أنواع الإجراءات الطبية أو الجراحية أو التشخيصية المتعلقة بحالتك الصحية / حالتك الصحية للمريض
والموصى بها لك / لمريضك ، وبدائلها وفوائدها ومخاطرها وحتى أضرارها المحتملة ، ورفض أو قبول أو إيقاف كل / بعضها في أي
مرحلة.

هذه الوثيقة، التي نريدك أن تقرأها وتفهمها، لم يتم إعدادها لإخافتك أو إبعادك عن الممارسات الطبية، ولكن لإبلاغك والحصول على
موافقتك في تحديد ما إذا كنت ستوافق على هذه الممارسات.

معلومات

التشخيص المسبق:
العلاج / الإجراءات المخطط له:
اسم / لقب الطبيب الذي سيقوم بإجراء العملية:

معلومات حول العملية ؛**التخدير العام** ☐

التعريف: يمكن تعريف التخدير العام على أنه حالة من النوم التام ، والقضاء على الإحساس بالألم وعدم الحركة عن طريق إعطاء
الأدوية عن طريق الوريد و / أو استنشاق غاز التخدير عن طريق التنفس (بما في ذلك وضع أنبوب في القصبة الهوائية إذا لزم
الأمور). فقدان كامل للوعي ، قلة الألم و / أو الجمود.
المخاطر المحتملة: بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تلف الفم والأسنان والتهاب الحلق وبحة في الصوت، والتخدير
الوعي عندما يكون تحتها ، وتلف الوصول إلى الأوعية الدموية ، والغثيان والقيء ، والشفت ، والتهاب الرئة ، وانخفاض ضغط الدم
، وانخفاض حرارة الجسم الخبيث (الحمى التي يمكن أن تكون قاتلة) ، إلخ.

التخدير الموضعي / التسكين: ☐

إنه إزالة التحسس وتثبيت أعصاب المنطقة الجراحية بحقن الدواء بإبر خاصة.
التخدير فوق الجافية الشوكي / فوق الجافية أو التخدير فوق الجافية / التسكين الشوكي
التعريف: التخدير النخاعي وفوق الجافية هو تطبيق أدوية التخدير الموضعي مباشرة على السائل الشوكي و / أو حول الحبل الشوكي
عن طريق دخول منطقة أسفل الظهر بإبرة و / أو قسطرة ، مما يوفر عدم الحركة و / أو الألم في الجزء السفلي من الجسم. المريض
واعي ويمكن إضافة التخدير إذا لزم الأمر. عدم الحركة و / أو عدم القدرة على الشعور بالألم في الجزء السفلي من الجسم.
المخاطر المحتملة: الصداع ، آلام أسفل الظهر ، إزالة الألم غير الكاملة ، الشعور بالضغط في الأذن ، النوبات المتشنجة ، العدوى ،
الضعف الدائم ، التمثيل ، تلف الأوعية الدموية ، تلف الأعصاب ، ضعف السمع ، فقدان السمع ، النبض ، انخفاض ضغط الدم ، تلف
الأعصاب ، الحساسية ، فشل الكتلة ، إعطاء الأدوية عن طريق الوريد ، إلخ.

إحصار الأعصاب الطرفية ☐

التعريف: هي عملية إزالة الجمود و / أو الألم في تلك المنطقة عن طريق إعطاء أدوية التخدير الموضعي حول الأعصاب المؤدية إلى
منطقة الجراحة. إزالة الألم وفقدان الحركة في موقع الجراحة.
المخاطر المحتملة: العدوى ، الضعف ، التمثيل الدائم ، إزالة الألم غير الكاملة ، النوبات المتشنجة ، تلف الأوعية الدموية ، تلف
الأعصاب ، الحساسية ، فشل الإحصار ، إعطاء الأدوية عن طريق الوريد ، إلخ.

التخدير الموضعي في الوريد ☐

التعريف: إزالة الألم في المنطقة الواقعة تحت العاصبة عن طريق تصريف الدم في الأوردة في الذراعين والساقين باستخدام عاصبة
وإعطاء دواء مخدر موضعي في الوريد. فقدان مؤقت للحركة و / أو إزالة الألم في الذراع أو الساق المراد تشغيلها.
المخاطر المحتملة: العدوى ، التمثيل الدائم ، عدم كفاية السيطرة على الألم ، النوبات المتشنجة ، تلف الأوعية الدموية ، الحساسية ،
إلخ.

التخدير الموضعي ☐

التعريف: في التدخلات الصغيرة ، لا يتم التدخل إلا في تخدير المنطقة. اعتمادا على موقع ونوع التدخل ، يتم تطبيق الدواء في الأنسجة
بقطرات أو كريمات أو بخاخات أو إبر صغيرة. المريض واع. يمكن إضافة التخدير حسب الحاجة. المنطقة المراد التدخل فيها غير
مؤلمة.

المخاطر المحتملة: العدوى ، الإزالة غير الكاملة للألم ، الحساسية ، إلخ.

SEDAYON / تسكين الألم

التعريف: إحداث شبه نعاس و / أو القضاء على الألم عن طريق إعطاء الدواء عن طريق الوريد و / أو استنشاق غاز التخدير عن طريق التنفس. إذا كان من الممكن إيقاف المريض عن طريق الصوت أو اللمس الخفيف ، يحدث تخدير مستيقظ ، وإذا أصبح أعمق من الإجراء ، والتخدير العميق ، وعندما يتعمق أكثر ، يحدث التخدير العام. انخفاض الإثارة والألم ، أو فقدان الذاكرة الجزئي أو الكامل ، أو فقدان الذاكرة (عدم القدرة على تذكر الأحداث).

المخاطر المحتملة: فقدان الوعي ، تثبيط التنفس ، الغثيان / القيء ، تلف الأوعية الدموية ، إلخ. بشكل عام ، هناك احتمال أن تتطور مضاعفات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتخدير ، مما قد يؤدي إلى العدوى ، وردود الفعل الدوائية والدم ، والنزيف ، وتكوين الجلطة ، وفقدان الإحساس ، وفقدان وظيفة أحد الأطراف ، والسكتة الدماغية ، وإصابات الدماغ ، والنوبة القلبية ، والحساسية أو الوفاة ، بشرط أن يتم رؤيتها في جميع طرق التخدير.

الفوائد المتوقعة من الإجراء:

من أجل أن تكون العملية الجراحية آمنة وسهلة وغير مؤلمة ، فإنها تساعد المريض على التخلص من وعيه ، والبقاء ثابتاً وأداء العملية دون ألم.

العواقب التي قد تواجهها إذا لم يتم تطبيق الإجراء:

بدون تخدير ، لن يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية. إذا كنت لا تقبل طرق التخدير الموضعي الموضحة أدناه ، فيمكن تطبيق التخدير العام ، ولكن في بعض الحالات لا يوجد بديل للتخدير العام.

الحمل / الشك:

إذا كان هناك حالة حمل / شك أو رضاعة طبيعية ، فيجب عليك بالتأكيد إبلاغ طبيبك بهذا الموقف. إذا لم يتم إبلاغ الطبيب بالموقف ، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية عن المضاعفات التي قد تنشأ عن إجراء التخدير ، وتؤكد من إبلاغ طبيبك قبل الإجراء من أجل منع الإجهاض والمخاطر التي تهدد حياة الأم والطفل وما إلى ذلك.

☐ أبلغت الطبيب أنني من بين المرضى في مجموعة المخاطر المذكورة أعلاه.

☐ أنا لست في مجموعة المخاطر المذكورة أعلاه.

مخاطر ومضاعفات الإجراء:

أجهزة الجهاز التنفسي

● **فشل الجهاز التنفسي المتقدم:** قد يتطور وفقاً للأمراض الموجودة مسبقاً ونوع الجراحة ومدتها. في هذه الحالات ، قد يتم رعايتك في وحدة العناية المركزة لفترة من الوقت. في بعض الأحيان قد يكون هناك ضيق في التنفس بسبب الألم بعد العملية. (يتم مساعدته من خلال تطبيق إدارة الألم).

● **التهاب الحلق:** قد يستغرق الأمر من 1-2 أيام بعد عملية جراحية طويلة يتم فيها وضع أنبوب في الجهاز التنفسي ، على الرغم من أنه شائع جداً ، إلا أنه نادراً ما يسبب مشكلة خطيرة

● **تسرب محتويات المعدة إلى الجهاز التنفسي:** من أهم المشاكل وأكثرها شيوعاً. لمنع ذلك ، إذا لم تكن هناك مشكلة أخرى (مثل الاثني عشر وتضيق المريء) ، فيجب عليك التوقف عن تناول الأطعمة الصلبة قبل 8 ساعات على الأقل والمشروبات السائلة قبل 6 ساعات. في حالة الطوارئ ، يمكن إبقاء هذه الفترة أقصر. تتراوح أوقات الصيام للرضع والأطفال من 2-6 ساعات. اتبع ما توصيه طبيبك في هذا الصدد.

مخاطر التجوّل:

● **إدخال إبرة خاصة يتم إدخالها في الوريد لحقن المصل في الشريان بسبب الاختلافات التشريحية النادرة جداً:** إذا تم إعطاء دواء هنا ، فقد تواجه خطر فقدان بعض أصابعك وذراعك. في بعض العمليات الجراحية ، يتم إدخال إبرة خاصة في الشريان لمراقبة ضغط الدم عن كثب. في هذه الحالة ، قد تحدث هذه الأضرار نادراً جداً.

● **المشاكل المتعلقة بالقلب:** تزيد مشاكل مثل قصور الشريان التاجي المتقدم ، وإحصار القلب ، وأمراض الصمامات ، والنوبات القلبية السابقة من المخاطر التي يسببها التخدير والجراحة. في بعض المرضى ، قد تحدث نوبة قلبية أثناء الجراحة وبعدها ، وإن كان ذلك نادراً جداً. من أجل منع مثل هذه المواقف غير المرغوب فيها ، قد يطلب منك طبيب التخدير إجراء فحص للقلب

الباطني أو أمراض القلب وتقديم توصيات من الطبيب المعني إذا كانت لديه أي شكوك حول حالتك الصحية.

• **تطبيقات القسرة على الأوعية الكبيرة:** يتم تطبيقها في جراحة القلب وجراحة الدماغ والأعصاب ، في المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز القلبي الوعائي ؛ من أجل التمكن من قياس الأجهزة التي تراقب نشاط الدورة الدموية ، أو فقط في المرضى الذين يعتقد أنهم يفقدون الدم أثناء الجراحة ، ويعانون من أمراض القلب الحادة ويحتاجون إلى وصول الأوعية الدموية على المدى الطويل بعد الجراحة. قد تحدث آثار غير مرغوب فيها مثل النزيف إلى المكان الذي سيتم إجراؤه فيه (الرقبة والفخذ والذراع وما إلى ذلك) وتجمع الهواء في الرئتين.

المخاطر المتعلقة بالأدوية:

• **الحساسية:** كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى ، قد تحدث بعض ردود الفعل التحسسية في الأدوية المستخدمة في التخدير.

• **الآثار الأخرى غير المرغوب فيها للأدوية:** انخفاض أو زيادة ضغط الدم ، انخفاض أو زيادة في النبض ، السكتة القلبية والتنفسية ، جفاف الفم ، صعوبة تذكر الأحداث التي تحدث في غضون 1-2 ساعة قبل الجراحة وبعدها ، الغثيان ، القيء ، الإمساك ، صعوبة التبول.

• **الحمى (Hypertermia الخبيثة):** قد يصاب بعض الأشخاص بحمى لا يمكن الوقاية منها نادرا جدا (1 / 10,000) وهي قاتلة للغاية حتى في أفضل الأماكن الممكنة.

المشاكل المتعلقة بالوضعية المعطاة أثناء الجراحة: أثناء الجراحة ، سحق الأعصاب المرتبط بالاستلقاء ساكنا وفي نفس الوضع لفترة طويلة ، وسحق الأعضاء مثل الوجه والصدر وما إلى ذلك بسبب الاستلقاء على المعدة ، وقد تحدث إصابات في العينين. اعتمادا على الدواء والتقنية التي سيتم استخدامها ، بالإضافة إلى الآثار الجانبية مثل الحساسية والتخدير والنعاس والحكة ، نادرا ما تحدث آثار جانبية يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء. بالإضافة إلى ذلك ، في تطبيقات العمود الفقري / فوق الجافية ، يمكن أيضا رؤية الآثار الجانبية المتعلقة بالتقنية المذكورة في قسم التخدير.

إذا كانت المضاعفات خطيرة و / أو مهددة للحياة ، فقد تحتاج إلى الدخول إلى العناية المركزة.

بدائل الإجراء، إن وجدت:

إذا فشلت الكتلة ، يمكن متابعة العملية بطريقة أخرى (مثل التخدير العام والتخدير الموضعي والتخدير) التي يراها طبيب التخدير مناسبة.

الوقت المقدر للمعاملة:

ذلك يعتمد على المتطلبات.

الآثار غير المرغوب فيها المحتملة للأدوية التي سيتم استخدامها والمسائل التي يتعين النظر فيها:

استخدم الأدوية الموصى بها من قبل طبيبك وفقا لتعليمات الاستخدام. إبلاغ طبيبك بالآثار غير المرغوب فيها المحتملة للأدوية والنقاط التي يجب مراعاتها سافعل.

النقاط التي يجب على المريض الانتباه إليها قبل وبعد العملية:

ما يجب عليك فعله قبل التخدير:

• لا تأكل أي شيء لمدة ثماني (8) ساعات قبل الجراحة حتى لا يتسرب القيء إلى مجرى الهواء. يمكنك تناول الماء قبل ساعتين (2) من الجراحة. عند الرضع والأطفال ، يجب التوقف عن تناول الأطعمة الصلبة والحليب الصناعي وحليب البقر قبل 6 ساعات على الأقل ، ويجب التوقف عن تناول حليب الثدي قبل 4 ساعات على الأقل ، ويجب إيقاف الماء والسوائل الصافية قبل ساعتين على الأقل. في بعض الحالات المتعلقة بالجهاز الهضمي ، قد يكون من الضروري الحفاظ على هذه الفترة لفترة أطول. لذلك ، استشر طبيبك لمعرفة وقت الصيام المطلوب.

• لماذا وكمن من الوقت يجب أن أصوم قبل التخدير / الجراحة؟

نظرا لأن الأدوية المستخدمة للتخدير / التخدير قد تتسبب في انقطاع الوعي وإزالة ردود الفعل التي تحمي الجهاز التنفسي ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ، حيث قد تهرب المادة المتبقية إلى القصبة الهوائية في حالة القيء المحتمل. لذلك ، يجب عليك بالتأكيد الصيام قبل التخدير. سيتم إخبارك بطريقة التخدير المراد تطبيقها وفترة الصيام التي يحددها طبيب التخدير وفقا لعمر. يجب عليك الامتنال لهذه المواعيد النهائية ، وإلا فقد يتم تأجيل الجراحة أو ستخاطر بجديتها إذا قمت بإخفاؤها.

• قد تحتاج إلى إعطاء عينة دم قبل الجراحة للفحوصات التي يراها طبيبك ضرورية.

Doküman Kodu:	HD. RB.571	İlk Yayın Tarihi:	12.05.2025	Rev. Tarihi:	-	Rev. No:	00	Sayfa No:	4 / 6
---------------	------------	-------------------	------------	--------------	---	----------	----	-----------	-------

- يجب عليك بالتأكيد إبلاغ طبيب التخدير بشكل صحيح عن أمراضك المزمنة والأدوية والمواد التي تستخدمها بانتظام. سيخبرك طبيب التخدير بأي منها يجب إزالته وأيها يجب قصه وكم من الوقت.
- يجب عليك إزالة أطقم الأسنان والنظارات والعدسات اللاصقة والمجوهرات (القلائد والأقراط والخواتم والثقب وما إلى ذلك) قبل القدوم إلى غرفة العمليات. لا يمكن لأولئك الذين يرتدون المعينات السمعية إزالتها إذا رغبوا في ذلك. في هذه الحالة ، يجب عليك إبلاغ طبيب التخدير.
- من فضلك لا تضع المكياج ولا تضع طلاء الأظافر على أظافرك.
- **ما يجب على المريض الانتباه إليه بعد التخدير:**
- من الطبيعي أن تشعر بالنعاس والتعب لفترة من الوقت بعد التخدير / الجراحة. قد يطول هذا اعتمادا على نوع ومدة التخدير الذي يتم إعطاؤه ، ونوع وجرعة أدوية التخدير / التوسكين التي يتم تناولها ، فلا داعي للقلق.
- من أجل قضاء فترة ما بعد الجراحة بشكل مريح ومريح ، سيتم تطبيق علاجات التوسكين بطريقة يراها طبيبك مناسبة وتنطوي على أقل مخاطر بالنسبة لك (عن طريق الفم ، الالتصاق بالجلد أو بخاخ الأنف أو المستقيم عند الأطفال ، عن طريق الحقن العضلي أو الذي يتحكم فيه المريض ، العمود الفقري / فوق الجافية).
- سيخبرك طبيبك متى يمكنك تناول السوائل / الطعام بعد الجراحة.
- إذا تقرر أنك ستعود إلى المنزل في يوم الجراحة ، فيجب عليك بالتأكيد الذهاب مع قريب بالغ ويجب ألا تكون بمفردك في الليلة الأولى. من المستحسن أن تقضي هذه الليلة في الراحة.
- لا ينصح بالتدخين وشرب الكحول لمدة 24 ساعة بعد الجراحة ، وقيادة حركة المرور بنشاط ، واستخدام الآلات الثقيلة واتخاذ قرارات مهمة ، حيث قد يكون ذلك غير مريح.
- ما لم ينص على خلاف ذلك، من المستحسن أن تأخذ الأدوية التي تستخدمها بنفس الطريقة، الجرعة والفترات الزمنية.
- **المشكلات التي قد تحدث إذا لم تنتبه إلى المشكلات الواجب الالتزام بها:**
- سيخبرك طبيبك بالمشاكل التي قد تواجهها إذا لم تنتبه إلى المشكلات التي يجب اتباعها

كيفية الحصول على مساعدة طبية في نفس الموضوع عند الضرورة:

- عدم قبول العلاج / الجراحة هو قرار ستتخذه بمحض إرادتك. إذا غيرت رأيك ، فيمكنك إعادة التقديم شخصيا إلى مستشفى (مستشفياتنا) التي يمكنها إجراء العلاج / الجراحة المعنية. **هاتف: 3400 811 0850**
- البحث الطبي:** أوافق على مراجعة المعلومات السريرية من سجلاتي الطبية للنهوض بالدراسة الطبية والبحث الطبي وتعليم الأطباء، بشرط الالتزام بقواعد سرية المريض في لائحة حقوق المريض.
- أوافق على نشر نتائج البحث في الأدبيات الطبية طالما أنها تحمي سرية المريض. أدرك أنني قد أرفض المشاركة في مثل هذه الدراسة وأن هذا الرفض لن يؤثر سلبا على علاجي بأي شكل من الأشكال.

موافقة

لقد قرأت المعلومات الموضحة أعلاه وأبلغني الطبيب الموقع أدناه. تم إبلاغي بالغرض والأسباب والفوائد والمخاطر والمضاعفات والبدائل والتدخلات العلاجية الإضافية للعلاج / الإجراء الذي سيتم إجراؤه. أوافق بوعي على هذه الصفقة دون أي تفسير إضافي ، دون أي ضغوط.

لإعطاء الموافقة وتلقي جميع أنواع المعلومات حول علاجي عندما أكون فاقدا للوعي بأي شكل من الأشكال أو عندما أكون غير قادر على إعطاء الموافقة في التدخلات التي سيتم إجراؤها لي فيما يتعلق بعلاجي.
.....أفوض الشخص المسمى (الشخص المفوض من قبل المريض هو ممثل المريض / يجب أن يوقع كممثل قانوني له).

في النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة العلاج الذي تلقينته في BHT CLINIC مستشفى إسطنبول تيما ، تركيا قانون سيتم تنفيذها، إسطنبول المحاكم مخول أن يكون قبول أنا. سيتم
..... (أفهم أنني قرأته بخط يدك ، وأنا أقبله).

<u>توقيع</u>	<u>تاريخ / وقت الموافقة</u>
مريض	/...../.....
الاسم واللقب (مكتوب بخط اليد)	

إذا كان المريض غير قادر على إعطاء الموافقة:

<u>توقيع</u>	<u>تاريخ / وقت الموافقة</u>
المريض / الممثل القانوني	/...../.....
الاسم واللقب (مكتوب بخط اليد)	

سبب عدم قدرة المريض على إعطاء الموافقة (يتم ملؤه من قبل الطبيب):

.....
.....



إلى المريض / الممثل القانوني المذكور أعلاه ، ومريض المريض / الممثل القانوني المكتوب أعلاه ، والعلاج / الإجراء الذي سيتم إجراؤه ، والغرض من هذا العلاج / الإجراء وسببه وفوائده ، والرعاية المطلوبة بعد العلاج / الإجراء ، والعلاج / الإجراء تم تقديم تفسيرات كافية ومرضية حول المخاطر والمضاعفات ، وبدائل العلاج / الإجراء ، ونوع التخدير الذي يجب تطبيقه إذا لزم الأمر للعلاج / الإجراء ، ومخاطر ومضاعفات التخدير. وقع المريض / الممثل القانوني على هذا النموذج ووافق عليه بموافقة الخاصة على أنه قد تم إبلاغه بشكل كافٍ بالعلاج / الإجراء.

التاريخ / الوقت	توقيع	الطبيب الذي سيقوم بإجراء العلاج / الإجراء
...../...../.....		الاسم اسم العائلة:
		عنوان:

إذا كان المريض يعاني من مشكلة في اللغة / التواصل.

ترجمت التفسيرات التي قدمها الطبيب للمريض. في رأيي ، المعلومات التي ترجمتها مريضة تم فهمه.

التاريخ / الوقت	توقيع	المترجمون
...../...../.....		الاسم واللقب (مكتوب بخط اليد):

يمكنك التقدم بطلب إلى وحدة حقوق المرضى أثناء النهار وإلى المشرف / المشرف الإداري الليلي ليلا لجميع شكاويك حول الممارسات الطبية أو أي مشكلة تريد ذكرها.

* الممثل القانوني: الوصي على الوصاية ، والوالدين للقصر ، والورثة القانونيين من الدرجة الأولى في غيابهم. التوقيع على وثيقة الموافقة هذه لا يلغي الحقوق القانونية للمريض.